

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-2-74 253361

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 86-22-75)

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 Francs

14 Février 1974 - n° 3

TAVELURE DU POIRIER

Dans certaines situations bien exposées (notamment dans les Landes) les bourgeons de variétés de poirier à débourrement précoce, atteignent ou dépassent le stade C 3.

A ce stade C 3 (apparition des premiers organes verts), les premières contaminations sont possibles. En effet, les périthèces arrivent rapidement à maturité et des projections d'ascospores sont possibles avec les prochaines pluies.

Il convient donc d'appliquer à présent un traitement fongicide sur les poiriers qui ont bien débourré. Le traitement sera exécuté sur les autres variétés au fur et à mesure qu'elles atteindront le stade sensible (C 3).

On utilisera de préférence un produit cuprique à la dose de 250 g de cuivre métal par hectolitre.

CLOQUE DU PECHER

Nous rappelons l'intérêt du traitement contre la cloque sur les arbres qui ont atteint le stade sensible (B) depuis notre bulletin du 31 janvier.

Dans les situations où le traitement préconisé sur les variétés les plus précoces a été délavé par les récentes pluies, la protection doit être renouvelée.

Dans ce cas, il sera préférable d'utiliser une spécialité organique de synthèse ; le cuivre étant phytotoxique sur les bourgeons ouverts.

L'Ingénieur d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles

J. TOUZEAU


L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant : L. BOUYX

P60

Stades-repères du pommier



Stades-repères du poirier

